

阿片類藥物过量反應

請按照以下步驟使用Nyxoid鼻腔噴霧劑

1

安全

檢查接受打針的人和地方有沒有任何不安全因素。



2

阿片類藥物是否过量？ 留意下列徵兆：

- 沒有反應
- 瞳孔縮小
- 呼吸不正常——呼吸淺慢或打鼾
- 皮膚蒼白或冰冷，嘴唇和指尖呈藍色或灰色



3

打電話三個零（000）



4

讓被搶救者仰臥


讓被搶救者仰臥，
檢查鼻腔沒有堵塞



5

像这样拿着NYXOID


請记住：Nyxoid®只包含1次使用的劑量。



6

將納洛酮 (NALOXONE) 注入鼻腔


將Nyxoid®的噴嘴插入鼻孔。
按壓噴嘴，把藥噴進鼻孔，直到噴嘴發出咔嗒聲為止。



7

他們有沒有呼吸？

如果沒有，就要做人工呼吸，如果您懂得怎樣做的話——吹進2口氣。



8

復甦

如果您懂得怎樣做的話，
讓患者處於復甦體位。
在救護車到達之前，一直陪著他們。



9

必要時再次給藥

如果沒有反應，在另一個鼻孔中噴
進第二劑Nyxoid®。
如果有的話，每隔2至3分鐘再給一劑，
直到病人恢復或救護車到達。



使用納洛酮來矯正阿片類藥物過量（例如海洛因、嗎啡、美沙酮、羟考酮、阿片類藥物處方藥、芬太尼等）。這種藥在2至5分鐘後開始生效，持續大約30至90分鐘。

如果有需要有關毒品相關治療（drug treatment）的資訊和幫助，
在澳大利亞境內任何地方每週7天、每天24小時都可以打免費電話
1800 250 015 給酒精與毒品資訊服務熱線。