

Ứng cứu người bị Quá liều do Opioid

Làm theo các bước này khi dùng thuốc xịt mũi Nyxoid

1

AN TOÀN


Kiểm tra người đó và khu vực để xem có điều gì không an toàn.



2

QUÁ LIỀU OPIOID? HÃY TÌM CÁC DẤU HIỆU

- Không đáp ứng
- Đồng tử co lại
- Không thở bình thường – thở nông và thở chậm hoặc ngừng
- Da nhợt nhạt hoặc lạnh, đầu ngón tay và môi xanh xao hoặc tái xám



3

HÃY GỌI BA SỐ KHÔNG (000)



4

ĐẶT NGƯỜI ĐÓ NẪM NGỬA


Đặt người đó nằm ngửa và kiểm tra xem mũi họ có thông thoáng.



5

CẦM NYXOID NHƯ THỂ NÀY

Nên nhớ ống Nyxoid® chỉ chứa 1 liều.




6

ĐƯA NALOXONE VÀO MŨI

Nhét đầu ống Nyxoid® vào lỗ mũi.


Nhấn đến khi nghe tiếng 'cách' để xịt liều thuốc.



7

NGƯỜI ĐÓ VẪN ĐANG THỞ?

Nếu không, hãy làm *hô hấp nhân tạo* nếu quý vị biết cách - thổi 2 hơi vào miệng người đó.



8

HỒI PHỤC

Đặt người đó ở 'tư thế hồi phục' nếu quý vị biết cách.

Ở cạnh họ cho đến khi xe Cứu thương đến.




9

CHO LIỀU THUỐC NỮA NẾU CẦN

Nếu người đó không có dấu hiệu đáp ứng, hãy xịt liều thứ nhì Nyxoid® vào lỗ mũi bên kia.

Nếu có sẵn, cho một liều nữa mỗi 2 hoặc 3 phút cho đến khi người đó hồi tỉnh hoặc xe Cứu thương đến.



Dùng naloxone để giúp đảo ngược tình trạng quá liều opioid (ví dụ heroin, morphine, methadone, oxycodone, opioids được kê toa, fentanyl). Mất khoảng 2-5 phút để thuốc bắt đầu có tác dụng, và kéo dài khoảng 30-90 phút.