

# الاستجابة الإسعافية لجرعة أوبيويد زائدة

اتبع الخطوات التالية لحقنة Prenoxad naloxone

2

## جرعة أوبيويد زائدة؟ تفقد العلامات

- لا توجد استجابة
- البؤبؤان لا يتحركان
- يتنفس بشكل غير طبيعي - تنفسه سطحي وبطيء أو يشخر
- جلده شاحب أو بارد، شفتاه وأطراف أصابعه زرقاء أو رمادية اللون



1

## السلامة

تفقد سلامة الشخص وأمان المكان.



4

## اقلب الشخص على جنبه

ضع الشخص في وضعية الإنعاش.



3

## اتصل على ثلاثة أرقام (000)


أعتقد أنها جرعة زائدة (overdose)



7

## اعطِ جرعة واحدة من NALOXONE

احقن 0,4 مليلتر، حتى الخط الأسود الأول على المحقنة (تحتوي محقنة Prenoxad على 5 جرعات).



6


## حدّد موضع إدخال الإبرة

أدخِل الإبرة في الجانب الخارجي من الفخذ أو الجزء العلوي من الذراع.



5


## ابرمْ الإبرة في محقنة PRENOXAD المملوءة مسبقاً



10

## كرّر الجرعة إذا لزم الأمر

إذا لم يستجب، احقن جرعة 0,4 مليلتر أخرى (حتى الخط الأسود التالي) مرة كل دقيقتين إلى 3 دقائق لحين أن يستعيد الشخص وعيه أو تحضر سيارة الإسعاف.



9

## الإنعاش

أقلب الشخص إلى "وضعية الإنعاش" إذا كنت تعرف الطريقة. ابقَ معه لحين وصول الإسعاف.



8

## هل يتنفس؟

إذا لم يكن يتنفس، استخدم تنفّس الإسعاف إذا كنت تعرف الطريقة - أقلب الشخص على ظهره وانفخ في فمه نفسين.



استخدم naloxone لإبطال مفعول جرعة أوبيويد زائدة (كالهيرويين أو المورفين أو الميثادون أو الأوكسيكودون أو عقاقير الأوبيويد التي يصفها الطبيب أو الفنتانيل). يأخذ naloxone مفعوله بعد دقيقتين إلى 5 دقائق ويستمر المفعول حوالي 30 إلى 90 دقيقة.

للمزيد من المعلومات والدعم بشأن معالجة المخدرات اتصل بـ "خدمة المعلومات لشؤون الكحول والمخدرات" التي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على الرقم 1800 250 015 مجاناً من أي مكان في أستراليا.